


Інтінова

Гель для піхви
7 туб по 5 г



Відновлюючи і зберігаючи
Надихаючи і перетворюючи



 7 компонентів
для відновлення і збереження


ANANTA
MEDICARE

ПОКРАЩЕННЯ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ПІСЛЯ КРІОЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ: цитоморфологічне та кольпоцервікоскопічне дослідження

КАМІНСЬКИЙ В.В., СУХАНОВА А.А., СУМЕНКО В.В., ТКАЧУК Р.Р., СОКОЛОВА К.І.

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, м. Київ, Україна

Вступ

Рак шийки матки (РШМ) є другим за поширеністю видом раку в жінок. Ризик розвитку раку шийки матки у жінок віком до 65 років коливається від 0,8 % в розвинених країнах до 1,5 % — у країнах, що розвиваються. Щороку спостерігається близько 530 000 нових випадків і 275 000 смертей від РШМ. Близько 85 % цих випадків мають місце в країнах, що розвиваються, у яких програми скринінгу функціонують несистемно. У країнах з ефективними програмами скринінгу відбулося різке скорочення захворюваності й зменшення стадії, на якій діагностується рак [1, 2].

Досвід країн, що досягли успіхів у боротьбі з раком шийки матки, переконливо демонструє, що найбільш потужним і ефективним інструментом є цервікальний скринінг. Саме шляхом запровадження обов'язкових скринінгових програм вдається взяти під нагляд усіх жінок із групи ризику (або більшу їх частину), своєчасно діагностувати передракові захворювання і, відповідно, запобігти РШМ [3].

Розвиток раку шийки матки є багатоступінчастим процесом, оскільки спочатку клітини епітелію шийки матки зазнають змін і стають аномальними. Ці відхилення називаються дисплазією, і вони пов'язані з підвищеним ризиком подальшого розвитку інвазивного раку шийки матки [1].

Дисплазія є найбільш поширеною передраковою патологією з атиповими змінами плоских клітин шийки матки в зоні трансформації. Якщо дисплазія прогресує, вона трансформується в плоскоклітинний рак [4].

Для опису результатів цитологічного дослідження сьогодні використовують загальноприйняту Бетесдинську класифікацію (Bethesda system), розроблену в 1998 році Національним інститутом раку США. З того часу класифікацію неодноразово переглядали та доопрацьовували, востаннє — у 2001 році. Саме в останній версії її сьогодні застосовують у всьому світі.

Класифікація дозволяє віднести цитологічний мазок до одного з трьох варіантів:

- нормальний (без патологічних змін);
- невизначений (ASCUS, що не є нормальним, але не дозволяє точно судити про характер ураження);
- плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження низького (low grade squamous intraepithelial lesions, LSIL) або високого (high grade squamous intraepithelial lesions, HSIL) ступеня тяжкості.

Слід звернути увагу, що дуже часто вітчизняні цитологи використовують класифікацію цервікальних інтраепітеліальних неоплазій (cervical intraepithelial neoplasia — CIN), розроблену в 1968 році. Однак це не зовсім правильно: CIN-класифікація призначена для гістологічного, а не для цитологічного висновку. Крім того, широко застосовують у практиці класифікацію дисплазій епітелію шийки матки [5].

Існують ексцизійні й аблятивні методи лікування дисплазії епітелію шийки матки (ДЕШМ). Конізація й петльова ексцизія є ефективними варіантами для лікування дисплазії тяжкого ступеня, але вони вимагають наявності висококваліфікованого персоналу, дорогі та можуть привести до порушення репродуктивної функції. Отже, більш консервативні аблятивні методи можуть бути кращими для молодих пацієнток фертильного віку, тому що дозволяють забезпечити, з одного боку, надійність та радикальність лікування, а з іншого — є найбільш щадними для пацієнток, які не народжували. Раціонально також їх використовувати в умовах обмежених ресурсів. Аблятивні методи, у тому числі кріотерапія, лазерна абляція, як правило, використовуються для лікування дисплазії легкого та середнього ступеня й можуть бути виконані в амбулаторних умовах [6].

Відповідно до рекомендацій ASCCP (2012), при виявленні HSIL (за винятком вагітних і жінок віком до 24 років) кращою тактикою є невідкладна (під час того ж прийому, на який пацієнтка прийшла з метою дізнатися результати цитологічного дослідження) петльова електрохірургічна ексцизія ураженої ділянки з наступним гістологічним дослідженням матеріалу [7].

Необхідність процедури обумовлена високим ризиком CIN III/carcinoma in situ та цервікального раку в жінок із HSIL, старших за 30 років: 50 і 7 % відповідно протягом 5 років при позитивному результаті тесту на вірус папіломи людини, 29 і 7 % — при негативному [8].

Ексцизійні методи тісно пов'язані зі збільшення ризику акушерських ускладнень, таких як передчасні пологи, передчасний розрив оболонок, низька маса тіла при народженні й кесарів розтин. Хоча показник ефективності консервативного лікування дисплазії перевищує 95 %, у пацієнток після застосування даних методів відмічається значна кількість рецидивів [9].

При виборі між двома цими видами лікування важливо враховувати ситуації, у яких показана виключно конізація шийки матки й категорично протипоказана абляція:

- незадовільні результати кольпоскопії при персистуючій CIN I;
- ураження ектоцервіксу CIN будь-якого ступеня тяжкості;
- пацієнтка вже отримувала лікування раніше.

У жінок із CIN II–III спостереження неприйнятне, оптимальною тактикою є лікування за допомогою ексцизії або абляції (допустима при CIN II, але неприйнятна при CIN III) за умови задовільних результатів кольпоскопії. При неможливості візуалізувати зону трансформації, а також у жінок із рецидивом CIN II–III або ураженням ектоцервіксу показана конізація [7].

Кріохірургія є руйнівним (абляційним) методом, що був упроваджений у гінекологію в кінці 1960-х років для лікування дисплазії епітелію шийки матки. Десятки тисяч пацієнток пройшли лікування кріотерапією, яка виявилася передбачуваною, надійною технікою лікування з мінімумом побічних ефектів і ускладнень. Кріохірургія є безпечною, недорогою та нескладною процедурою лікування передракових захворювань нижніх відділів статевих шляхів без погіршення фертильності пацієнток [10].

Кріотерапія знищує ектоцервікс шляхом заморожування за допомогою стиснутого газоподібного холодоагенту. Цей метод демонструє високі показники ефективності лікування в усіх регіонах світу (94 % для CIN I, 92 % для CIN II і 85 % для CIN III) [6].

Загоєння рани відбувається шляхом формування під зоною кріонекрозу ексудату, що змінюється фібриноїдним некрозом і шаром незрілої грануляційної тканини. Зовнішні шари поступово відділяються, залишаючи на поверхні грануляції, вкриті фіброцитами або сполучною тканиною. Потім на поверхні розвиваються незрілі клітини плоского епітелію та резервні клітини підлеглого циліндричного епітелію. У процесі загоєння рани синтезується колаген III типу, що першим знаходиться в стромі, а згодом перетворюється на колаген I типу. Після цього повністю формується нормальний плоскоклітинний шар епітелію [11].

Перманентна дія стресових факторів, несприятлива екологічна ситуація та напружений радіаційний фон, що склався після Чорнобильської катастрофи, знижують здатність жіночого організму до повноцінної самостійної репарації уражених чи зруйнованих клітин слизової оболонки шийки матки. Це вимагає від лікарів постійного пошуку засобів, що допомагають покращити регенеративну здатність ектоцервіксу для успішного лікування передракової цервікальної патології.

Одним із таких засобів є вагінальний гель Інтінова — біологічна добавка, що сприятливо впливає на стан статевих органів за рахунок природних компонентів, які входять до її складу.

Екстракт алое має регенеративні властивості, сприяє підвищенню пружності м'язів піхви, а також забезпечує зволоження, усунення сухості піхви та пов'язаних з нею симптомів (свербіж, подразнення, дискомфорт). Екстракт алое також має протизапальні, антибактеріальні й протигрибкові властивості.

Екстракт мигдалю містить велику кількість біологічно активних речовин: поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, Е, групи В, Н, РР, мікроелементи, амінокислоти, за рахунок чого покращує живлення тканин піхви, кровообіг статевих органів жінки, стимулює вироблення ендogenous колагену, сприяє підвищенню еластичності й зміцненню тканин.

Екстракт гамамелісу містить дубильні речовини, за рахунок чого чинить в'язучий й судинозміцнюючий вплив. Рослина тонізує м'язи піхви й ущільнює її слизову оболонку. Відзначаючись антимікробною, противірусною й фунгіцидною фармакологічною дією, гамамеліс є профілактичним компонентом засобу Інтінова, що запобігає виникненню вагінальних інфекцій.

Екстракт пуерарії є фітоестрогеном, що сприяє відновленню слизової оболонки піхви, підвищенню синтетичних процесів у клітинах, посиленню циркуляції крові.

Екстракт женьшеню має біостимулюючі, імуностимулюючі й адаптогенні властивості. Женьшень є ефективним тонізуючим засобом, підвищує кровообіг у статевих органах.

Екстракт гранатового дерева чинить антиоксидантний і репаративний фармакологічний вплив, стимулює синтез білків, еластину й колагену в слизовій оболонці піхви. Ця рослина перешкоджає коливанням рН і виникненню дисбактеріозу піхви.

Гіалууронова кислота, як полісахарид, сприяє зволоженню піхви та репарації слизової оболонки. Також даний компонент гелю Інтінова покриває слизову оболонку піхви, захищаючи її від негативного впливу екзогенних факторів

Отже, завдяки наявності у складі препарату великої кількості біологічно активних речовин природного походження (і їх високій терапевтичній концентрації порівняно з іншими лікарськими засобами) гель Інтінова зволожує, відновлює слизову оболонку піхви, сприяє підвищенню її тонуусу й еластичності, забезпечує її захист від патогенної флори.

Метою нашого дослідження було визначити ефективність застосування вагінального гелю Інтінова щодо покращення репаративно-регенеративних процесів у слизовій оболонці шийки матки після кріодеструкції.

Матеріали й методи

У дослідженні брали участь 70 жінок, які перебували під спостереженням у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

Критерії включення в дослідження: відсутність вагітності, вік від 18 до 45 років, стан після кріотерапії дисплазії епітелію шийки матки, відсутність тяжкої соматичної патології.

Перед включенням у дослідження жінки були обстежені на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, пройшли відповідне етіотропне лікування при визначенні запальних процесів, після чого всім жінкам була проведена кріодеструкція шийки матки.

Дисплазія епітелію шийки матки легкого та середнього ступеня тяжкості була виявлена кольпоскопічно й підтверджена цитологічним та гістологічним методом. Кольпоцервікоскопію проводили із застосуванням діагностичного розчину (3% acidi acetici) та проби Шиллера. Цитологічні препарати забарвлювали за методиками Папаніколау, Паппенгейма, Романовського — Гімзи.

Усі жінки, які брали участь в дослідженні, були розподілені на дві рівноцінні групи методом випадкової вибірки. У результаті було створено 2 групи: I — група спостереження (40 жінок) та II — група контролю (30 пацієнток).

Розподіл жінок у групах відповідно до ступеня тяжкості ДЕШМ був таким. У I групі CIN I визначалася у 28 жінок (70 %), CIN II — у 12 жінок (30 %). У II групі CIN I діагностували в 67,7 % випадків (21 жінка), CIN II — в 32,3 %, тобто у 9 жінок.

Усім жінкам групи спостереження на 14-й день після кріодеструкції була призначена регенеруюча терапія із застосуванням вагінального гелю Інтінова протягом 14 днів.

Пацієнткам групи контролю на 14-й день після кріодеструкції призначалась відновлювальна місцева терапія згідно з рекомендаціями уніфікованих клінічних протоколів.

Ступінь регенерації ектоцервіксу та ефективність лікування оцінювались кольпоскопічно, бактеріоскопічно та цитологічно кожні 5–7 днів після кріодеструкції. Критерієм успішного вилікування були: кольпоскопічно - вчасна репарація епітелію шийки матки, відсутність деформацій епітелію шийки матки, відсутність запалення судин, цитологічно - нормальне відновлення структури клітин, нормальний вагінальний біоценоз.

Також до показників ефективності лікування входила переносимість призначеної терапії, тобто відсоток токсико-алергічних реакцій на основі об'єктивних та суб'єктивних ознак.

Результати та їх обговорення

Основна кількість хворих — 82,9 % (58 пацієнток) — були віком від 20 до 35 років. Середній вік пацієнток становив $31,50 \pm 3,95$ року.

Серед обстежуваних жінок лише 22 (31,4 %) мали постійного статевого партнера, а 68,6 % (48 пацієнток) мали від 2 до 7 статевих партнерів в анамнезі.

Клінічний ефект — повна репарація церві кального епітелію виявлений у всіх хворих основ-

ної групи (I) та 27 пацієток (90 %) контрольної групи (II). Решта — 3 (10 %) жінок — потребували повторного курсу лікування до досягнення позитивного результату.

При цьому в основній групі повна регенерація ектоцервіксу відбулась на 3–4-й тиждень лікування, на той час як у жінок контрольної групи ознаки репарації спостерігались на 6–7-й тиждень.

Регенерація відбувається як в епітеліальних, так і в сполучнотканинних шарах слизової оболонки. Ці зміни можна констатувати як цитологічно, так і кольпоскопічно після періоду некрозу протягом перших 3 тижнів.

Основними кольпоскопічними критеріями якісної репарації шийки матки були: наявність багат шарового плоского епітелію рівномірної та нормальної товщини, рожевого забарвлення, що свідчить про адекватне гормональне насичення (рис. 1).

До кольпоскопічних ознак неповної, патологічної репарації ектоцервіксу належить: рельєфний, нерівномірний характер слизової оболонки (рис. 3, 5) з вогнищами справжньої ерозії (рис. 4), синдромом коагульованої шийки матки (рис. 2), субепітеліальним ендометріозом, голчастою гіперплазією сполучної тканини (рис. 6).

Нормальна цитологічна картина характеризувалась двовимірним розташуванням клітин без нашарування, причому полярність клітин зберігалась. Відзначався помірний ступінь збільшення ядер (у 2–3 рази). Ядра мали рівний округлий чи овальний контур, ядерна мембрана при цьому була цілою, не потовщеною, анізокаріоз слабкий. Хроматин у ядрах дрібнозернистий, рівномірно розташований, дещо ущільнений. Ця ущільненість хроматину обумовлювала слабку гіперхромазію ядра. Ядерця в ядрах помітні, трохи збільшені в розмірах. Цитоплазма вакуолізована. При репарації, як правило, наявна гіперплазія субциліндричних клітин із подальшими метапластичними змінами. У більшості випадків фоном є лейкоцитарний інфільтрат, у якому переважали нейтрофіли й помірна кількість макрофагів. Лімфоїдні елементи відсутні.

Гіперплазія резервних клітин з ознаками активної метапластичної проліферації (рис. 9) сприяє переміщенню зони стику багат шарового й циліндричного епітелію вглиб ектоцервіксу. Тому при добрій репарації зона стику епітелію кольпоскопічно не візуалізується. І навпаки, у жінок II групи зона стику не переміщується, затримується в ектоцервіксі, що є свідченням поганої репарації.

Отже, у пацієток I групи переважно відмічалось деяке пришвидшення регенеративних процесів порівняно з нормою, вони характеризувались такими цитологічними ознаками: розташування клітин у вигляді двовимірних скупчень, без нашарувань, незначне збільшення ядер, ядра округлі, з рівними контурами (рис. 10), дрібнозернистим гомогенним хроматином, поодинокими невеликими ядерцями, незначною лейкоцитарною інфільтрацією, помірною кількістю макрофагальних клітин.

У II групі цитологічна картина свідчила про не зовсім нормальний перебіг репаративного процесу, а саме: у слизовій оболонці шийки матки наявні тривимірні скупчення клітин ектоцервіксу зі збільшенням ядер (максимум у 4 рази), анізокаріозом (рис. 11), ущільненням великозернистого хроматину, вираженими, дещо збільшеними ядерцями. Присутня виражена лейкоцитарна інфільтрація з поодинокими макрофагами та лімфоїдними елементами.

У пацієток I групи у 35 випадках (87,5 %) була наявна лактобактеріальна мікрофлора (рис. 7, 8), а в пацієток II групи лактобактерії зустрічались у 7 (23,3 %) жінок, у решти — змішана кокобактеріальна мікрофлора (рис. 12) та елементи грибів роду *Candida*.

У 25 жінок II групи (83,3 %) серед лейкоцитарного інфільтрату замість макрофагів виявляється до 20 % лімфоїдних елементів, що свідчить про розмноження поодиноких мікроорганізмів, які залишились після санації слизової оболонки шийки матки й у відновлювальному періоді обумовили патологічний репаративний процес та зміни, характерні для запалення.

Повна реепітелізація ектоцервіксу на 21–25-й день відмічена в 32 жінок (80 %) основної групи; у 8 жінок (20 %) повна репарація епітелію шийки матки відбулась на 27-й день після кріохірургії.

У контрольній групі процеси репарації епітелію шийки матки перебігали повільніше. Зокрема, тільки в 13 пацієток (43,3 %) повна реепітелізація шийки матки спостерігалась на 35-й день, у 9 (30 %) — на 40-й день, у 5 (16,7 %) досліджуваних — на 45-й день. У 3 (10 %) жінок групи контролю не відмічено кольпоскопічних та мікроскопічних ознак повної епітелізації шийки матки.

Жодного випадку токсико-алергічних реакцій при застосуванні досліджуваного лікувального засобу під час спостереження не відмічалось.



Рисунок 1. Кольпоскопія, I група. Нормальна репарація епітелію шийки матки, рівномірний колір слизової оболонки, шийка вкрита багат шаровим плоским епітелієм; x 12



Рисунок 2. Кольпоскопія, II група. Патологічна репарація епітелію шийки матки, синдром коагульованої шийки, нерівномірний колір слизової оболонки; x 20



Рисунок 3. Кольпоскопія, II група. Патологічна репарація епітелію шийки матки, нерівномірний ацетобілій епітелій з грубим рельєфом; x 20




Рисунок 4. Кольпоскопія, II група. Патологічна репарація епітелію шийки матки, нерівномірний ацетобілій епітелій зі справжніми ерозіями; x 20



Рисунок 5. Кольпоскопія, II група. Проба Шиллера. Патологічна неповна репарація епітелію шийки матки, нерівномірне забарвлення розчином Люголя, деформація слизової оболонки; x 20



Рисунок 6. Кольпоскопія, II група. Патологічна неповна репарація епітелію шийки матки, у II зоні на 12 год наявна ділянка голчатої гіперплазії сполучної тканини, зона стику залишилась в ектоцервіксі; x 20




Рисунок 7. Цитограма, I група. Нормальна репарація епітелію шийки матки, частковий цитоліз, багато лактобактерій, голі ядра, відсутність лейкоцитів, епітелій нормоморфний. Забарвлення за Папаніколау; x 400




Рисунок 8. Цитограма, I група. Нормальна репарація епітелію шийки матки, багато лактобактерій, поодинокі лейкоцити, базофільний та еозинофільний епітелій, епітелій нормоморфний. Забарвлення за Папаніколау; x 400




Рисунок 9. Цитограма, I група. Нормальна репарація епітелію шийки матки, наявні лактобактерії, відсутні лейкоцити, епітелій з ознаками активної метапластичної проліферації. Забарвлення за Папаніколау; x 400




Рисунок 10. Цитограма, I група. Нормальна репарація епітелію шийки матки, є лактобактерії, наявний нормоморфний плоский епітелій, у центрі — дві клітини циліндричного епітелію зі збільшенням ядер у 2 рази. Забарвлення за Паппенгеймом; x 600




Рисунок 11. Цитограма, II група. Патологічна репарація епітелію шийки матки, наявність лейкоцитів, змішана кокова флора, відсутність лактобактерій, ядра з помітним анізокаріозом, ущільнення хроматину, подекуди гіперхроматоз. Забарвлення за Романовським — Гімзою; x 400




Рисунок 12. Цитограма, II група. Патологічна репарація епітелію шийки матки, наявність великої кількості лейкоцитів, змішана кокова флора. Забарвлення за Паппенгеймом; x 400

Таблиця 1. Цитологічна характеристика репаративних процесів ектоцервіксу шийки матки після кріоеплізу

Групи	Цитологічна характеристика							
	Розташування клітин	Збільшення ядер	Структура ядра	Хроматин	Ядерця	Лейкоцити	Макрофаги	Мікроорганізми
I (n = 40)	Двовимірні скупчення	Слабке збільшення (в 1,5–2 рази)	Кругла, рівний контур	Дрібно-зернистий, рівномірний	0–1–2, слабко збільшені	До 50	Помірна кількість	+ До 10 у п/з
II (n = 30)	Дво- та тривимірні скупчення	Помірне збільшення (у 2–4 рази)	Кругло-овальна, анізокаріоз	Дрібно-, велико-зернистий, ущільнений, дещо гіперхромний	1–4, помірно збільшені, виділяються	50–100	Поодинокі	++ 10–30 у п/з +++ > 30 у п/з

Висновки

За результатами проведених клініко-лабораторних спостережень можна зробити висновок, що застосування вагінального гелю Інтінова покращує якість та швидкість регенеративно-репаративних процесів в ектоцервіксі.

У жінок основної групи (I) відмічалась нормальна цитологічна та кольпоскопічна картина репаративних процесів в ектоцервіксі, які завершилися на 21–28-й день після кріодеструкції.

У жінок контрольної групи (II) кольпоскопічні та цитологічні характеристики ектоцервіксу не відповідали нормальній репаративній картині, що свідчить про порушення процесів регенерації слизової оболонки шийки матки. Про порушення відновних процесів у ектоцервіксі свідчить і тривалість репарації, яка у жінок контрольної групи становила від 5 до 7 тижнів.

У 87,5 % пацієток I групи у процесі репарації була відмічена лактобактеріальна мікрофлора. У 83,3 % жінок контрольної групи відмічались лімфоїдна інфільтрація та порушення вагінального біоценозу, що свідчить про персистенцію хронічного запального процесу в екто- та ендочервіксі.

Отже, включення вагінального гелю Інтінова в місцеве лікування шийки матки після кріодекструкції обґрунтоване й клінічно виправдане.

Результати клінічного випробування показали добру переносимість гелю Інтінова й відсутність патологічних побічних реакцій при його застосуванні в пацієток.

Список літератури

- Heijden E., Lopes A.D., Bryant A., Bekkers R., Galaal K. Follow-up strategies after treatment (large loop excision of the transformation zone (LLETZ) for cervical intraepithelial neoplasia (CIN): Impact of human papillomavirus (HPV) test // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. — 2015. — Issue 1.
- Коханевич Е.В. и др. Патология шейки и тела матки: Руководство для врачей / Под ред. проф. Коханевич Е.В. — Нежин: Гидромакс, 2009. — 352с.
- Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R., Eser S., Mathers C. et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 // *Int. J. Cancer*. — 2015. — 136. — E359-386.
- Неоплазии шейки матки: краткий курс для практикующего врача. Предраковые заболевания шейки матки: диагностика и врачебная тактика: информационный бюллетень / Т.Н. Бебнева, И.Д. Ипастова; под ред. В.Е. Радзинского. — М.: Редакция журнала Status Praesens, 2016. — 20 с.
- Martin-Hirsch P.P.L., Paraskeva E., Bryant A., Dickinson H.O. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. — 2013. — Issue 12.
- ACOG Practice bulletin № 157: Cervical cancer screening and prevention // *Obstet. Gynecol.* — 2016. — Vol. 127, № 1. — P. e1-e20.
- Dolman L., Sauvaget C., Muwonge R., Sankaranarayanan R. Meta-analysis of the efficacy of cold coagulation as a treatment method for cervical intraepithelial neoplasia: a systematic review // *BJOG*. — July 2014. — Vol. 121, Issue 8. — P. 929-942.
- Massad L.S., Einstein M.H., Huh W.K. 2012 Updated consensus guidelines for the management of abnormal cervical cancer screening tests and cancer precursors // *Obstet. Gynecol.* — 2013. — Vol. 121, № 4. — P. 829-846.
- Katki H.A., Schiffman M., Castle P.E. et al. Fiveyear risk of cervical cancer and CIN3 for HPV-positive and HPV-negative high-grade Pap results // *J. Low Genit. Tract. Dis.* — 2013. — Vol. 17. — P. s50-s55.
- Koizumi et al. Investigation of the Safety and Efficacy of Hg-Cin Treatment Using Amtc400 // *Molecular and Clinical Oncology*. — 2016. — 5. — 310-316.
- Wojciech R. The importance of cryosurgery in gynecological practice // *Ginekol Pol.* — 2011 Aug. — 82(8). — 618-22.
- Hoshi K., Honda S., Endo C., Sato A., Sekimoto S. Wound Healing Process in the Portio Vaginalis Uteri after CO₂-Laser Treatment // *Tohoku J. Exp. Med.* — 1993. — 170(3). — 135-146.