

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)  
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА



**Пребіотик і пробіотик**  
**для регуляції мікрофлори шлунково-кишкового тракту**

**Склад: 1 саше містить:**

*Lactobacillus sporogenes* (*Bacillus coagulans*) – 50 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

*Streptococcus faecalis* (*Enterococcus faecalis*) – 30 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

*Clostridium butyricum* – 2 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

*Bacillus mesentericus* – 1 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

**Допоміжні речовини:** лактоза безводна, антиспікаючий агент кремнію діоксид колоїдний безводний.

**Характеристика компонентів:**

***Lactobacillus sporogenes* (*Bacillus coagulans*)** – спороутворююча бактерія, яка підтримує ріст корисних бактерій та пригнічує ріст патогенних, тим самим підтримує здоровий баланс мікрофлори кишечника.

*Lactobacillus sporogenes* проявляє імуностимулюючу дію, за рахунок продукції імуноглобуліну М, G та А, тим самим здатна покращувати імунітет людини.

Спори *Lactobacillus sporogenes* кислотостійкі, потрапляючи у кишечник, вони дозрівають та розмножуються. Спори продукують молочну кислоту, яка вільно проходить крізь мембрани та знижує внутрішньоклітинне рН в патогенах. Це в свою чергу веде до порушення метаболічних процесів та загибелі патогенних мікроорганізмів. Також, спори продукують бактеріоцини (речовини, що здатні пошкоджувати мембрану патогенної бактерії), які проявляють антимікробну активність. За рахунок участі у розщепленні білків та вуглеводів *Lactobacillus sporogenes* сприяє нормалізації травлення.

***Streptococcus faecalis*** – грампозитивна бактерія, яка є представником нормальної мікрофлори кишечника. *Streptococcus faecalis* відноситься до роду *Enterococcus*, тому, як представник цього роду, здатна запобігати адгезії (прилипанню) та розмноженню патогенних бактерій на слизовій оболонці кишечника. *Streptococcus faecalis* виявляє стійкість до бета-лактамних антибіотиків та аміноглікозидів, тому може використовуватись разом з антибіотиками.

***Bacillus mesentericus*** – спороутворююча бактерія, яка пригнічує ріст патогенних бактерій: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus albus*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Streptococcus viridans*, *Bacillus anthracis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhi*. *Bacillus mesentericus* бере участь в синтезі ферменту амілази, яка сприяє перетравленню та засвоєнню вуглеводів.

*Streptococcus faecalis* (*Enterococcus faecalis*), *Bacillus mesentericus* сприяють значному збільшенню кількості лакто- та біфідобактерій у кишечнику.

***Clostridium butyricum*** – спороутворююча бактерія, проявляє ефективність по відношенню до патогенної бактерії - *Clostridium difficile*, сприяючи зменшенню її розмноження. *Clostridium butyricum* продукує коротколанцюгові жирні кислоти, такі як масляна та оцтова кислота, завдяки

чому зменшує рН у кишечнику, та як наслідок ріст патогенних бактерій. Clostridium butyricum також сприяє регуляції роботи кишечника.

**Рекомендації до споживання:** комплекс може бути рекомендований як додаткове джерело пребіотиків та пробіотику, що сприяють:

- відновленню екобалансу кишкової мікрофлори;
- попередженню порушення мікрофлори кишечника при прийомі антибіотика (антибіотик-асоційована діарея);
- нормалізації стану при розладах шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з наявністю шлунково-кишкових інфекцій;
- нормалізації травлення, за рахунок вироблення травних ферментів;
- зміцненню опірних сил організму, шляхом покращення роботи імунітету проти мікробних інфекцій.

Перед споживанням рекомендована консультація з лікарем.

**Попередження:** не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Протипоказання:** індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період годування груддю, дитячий вік до 3-х років.

**Спосіб вживання:** вміст саше необхідно розчинити в достатній кількості води (20-100 ml (мл) на одне саше) та приймати всередину незалежно від прийому їжі.

**Дозування:** Сантіжен рекомендовано дітям від 3 років та дорослим. Дорослі та діти старше 12 років: рекомендовано приймати по 1 саше 3-4 рази на день.

Дітям віком 6 - 12 років: рекомендовано приймати по 1 саше 2 рази на день.

Дітям віком 3 - 6 років: рекомендовано 1 саше на день.

**Термін вживання:** 7-14 днів, або приймати за рекомендацією лікаря. За необхідності курс Сантіжен можна повторити.

**Форма випуску:** порошок у саше по 1 g (г), по 20 саше у коробці.

**Умови зберігання:** зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °C в оригінальній упаковці виробника.

**Зберігати у недоступному для дітей місці.**

**Термін придатності:** 2 роки від дати виробництва.

**Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Виробник:** Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. + 91 1147050531. Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза-II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар (Радж.), Індія.

**Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача:**

ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 766-07-44.



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)  
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА



**Пребіотик і пробіотик**  
**для регуляції мікрофлори шлунково-кишкового тракту**

**Склад: 1 капсула містить:**

*Lactobacillus sporogenes* (*Bacillus coagulans*) – 100 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

*Streptococcus faecalis* (*Enterococcus faecalis*) – 60 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

*Clostridium butyricum* – 4 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

*Bacillus mesentericus* – 2 x 10<sup>6</sup> КУО (CFU)

**Допоміжні речовини:** *лактоза безводна.*

Капсула: желатин, вода очищена, барвник титану діоксид.

**Характеристика компонентів:**

***Lactobacillus sporogenes* (*Bacillus coagulans*)** – спороутворююча бактерія, яка підтримує ріст корисних бактерій та пригнічує ріст патогенних, тим самим підтримує здоровий баланс мікрофлори кишечника.

*Lactobacillus sporogenes* проявляє імуностимулюючу дію, за рахунок продукції імуноглобуліну М, G та А, тим самим здатна покращувати імунітет людини.

Спори *Lactobacillus sporogenes* кислотостійкі, потрапляючи у кишечник, вони дозрівають та розмножуються. Спори продукують молочну кислоту, яка вільно проходить крізь мембрани та знижує внутрішньоклітинне рН в патогенах. Це в свою чергу веде до порушення метаболічних процесів та загибелі патогенних мікроорганізмів. Також, спори продукують бактеріоцини (речовини, що здатні пошкоджувати мембрану патогенної бактерії), які проявляють антимікробну активність. За рахунок участі у розщепленні білків та вуглеводів *Lactobacillus sporogenes* сприяє нормалізації травлення.

***Streptococcus faecalis*** – грампозитивна бактерія, яка є представником нормальної мікрофлори кишечника. *Streptococcus faecalis* відноситься до роду *Enterococcus*, тому, як представник цього роду, здатна запобігати адгезії (прилипанню) та розмноженню патогенних бактерій на слизовій оболонці кишечника. *Streptococcus faecalis* виявляє стійкість до бета-лактамних антибіотиків та аміноглікозидів, тому може використовуватись разом з антибіотиками.

***Bacillus mesentericus*** – спороутворююча бактерія, яка пригнічує ріст патогенних бактерій: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus albus*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Streptococcus viridans*, *Bacillus anthracis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhi*. *Bacillus mesentericus* бере участь в синтезі ферменту амілази, яка сприяє перетравленню та засвоєнню вуглеводів.

*Streptococcus faecalis* (*Enterococcus faecalis*), *Bacillus mesentericus* сприяють значному збільшенню кількості лакто- та біфідобактерій у кишечника.

***Clostridium butyricum*** – спороутворююча бактерія, проявляє ефективність по відношенню до патогенної бактерії - *Clostridium difficile*, сприяючи зменшенню її розмноження. *Clostridium butyricum* продукує коротколанцюгові жирні кислоти, такі як масляна та оцтова кислота, завдяки

чому зменшує рН у кишечнику, та як наслідок ріст патогенних бактерій. Clostridium butyricum також сприяє регуляції роботи кишечника.

**Рекомендації до споживання:** комплекс може бути рекомендований як додаткове джерело пребіотиків та пробіотику, що сприяють:

- відновленню екобалансу кишкової мікрофлори;
- попередженню порушення мікрофлори кишечника при прийомі антибіотика (антибіотик-асоційована діарея);
- нормалізації стану при розладах шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з наявністю шлунково-кишкових інфекцій;
- нормалізації травлення, за рахунок вироблення травних ферментів;
- зміцненню опірних сил організму, шляхом покращення роботи імунітету проти мікробних інфекцій.

**Попередження:** не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Протипоказання:** індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період годування груддю, дитячий вік до 6-ти років.

**Спосіб вживання:** капсулу необхідно запити достатньою кількістю води та приймати незалежно від прийому їжі. У разі неможливості проковтнути капсулу (дитячий та похилий вік), вміст капсули можна розчинити в невеликій кількості води та приймати всередину незалежно від прийому їжі.

**Дозування:** Сантіжен Форте рекомендовано дітям від 6 років та дорослим.

Дорослі та діти старше 12 років: рекомендовано приймати по 1 капсулі 1-2 рази на день.

Дітям віком 6-12 років: рекомендовано приймати по 1 капсулі на день.

Перед споживанням рекомендована консультація з лікарем.

**Термін вживання:** 7-14 днів, або приймати за рекомендацією лікаря. За необхідності курс Сантіжен Форте можна повторити.

**Форма випуску:** по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці.

**Умови зберігання:** зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

**Зберігати у недоступному для дітей місці.**

**Термін придатності:** 2 роки від дати виробництва.

**Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Виробник:** Ананта Медікеар Лімітед,

юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. + 91 1147050531.

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза-II, ПІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар (Радж.), Індія.

**Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача:**

ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 766-07-44.

