

Алергічний риніт



Відомий також як «сінна лихоманка» — запальне захворювання слизової оболонки носа, що характеризується епізодичним порушенням назального дихання, виділенням слизу із носа, в основі якого лежать алергічні реакції негайного типу.

Прояви алергічного риніту



Назальні

- Ринорея
- Чхання
- Свербіж слизової оболонки носа
- Закладеність носа
- Порушення нюху

Неназальні

- Алергічний кон'юктивіт
- Головний біль
- Свербіж слизової оболонки горла
- Дерматит носогубного трикутника
- Кропив'янка

Алергічний риніт

Сезонний

Сезоне підвищення вмісту алергенів в оточуючому середовищі. Наприклад, розповсюдження пилку в період з травня по серпень

Цілорічний

Постійний вміст алергенів у навколишньому середовищі. Наприклад, алергени пліснявих грибів, побутової хімії, шерсті тварин

Алгоритм фармацевтичної опіки пацієнтів з алергічним ринітом

Приступи чихання, закладеність носу, водянисті виділення із носу, пов'язані з дією алергену, продовжуються більше 3-х днів?

так

Варто звернутися до лікаря

Ні

Чи спостерігається принаймні один із наступних симптомів:

- Приступи задухи;
- набряк гортані (осиплість голосу, лаючий кашель, задуха);
- Розповсюдження набряку на верхню половину обличчя;
- Переднепритомний стан;
- Гнійні виділення із носу;

так

Варто звернутися до лікаря

Ні

Чи не пов'язані ці симптоми з застудними захворюваннями?

Чи присутні наступні симптоми:

- Підвищення температури тіла;
- Кашель;
- Першіння та біль в горлі;

так

Раціонально застосувати безрецептурні препарати для позбавлення від симптомів застуди. Препарат вибору – ГРИПФЛЮ, при болі в горлі льодяники Гамма.

Ні

Для полегшення стану рекомендовано використовувати безрецептурні антигістамінні засоби.

Увага! Чи ведете Ви діяльність, при якій необхідна концентрація уваги та збереження швидкості реакції?

так

Надавати перевагу засобам 2-го чи 3-го покоління, які не викликають сонливості. Препарат вибору – Фексофенадину г/х 120,180 мг - ТИГОФАСТ.

Ні

Можлива рекомендація засобів 1-го покоління з обов'язковим попередженням про можливі побічні дії у вигляді сонливості, зниження швидкості реакції, розвитку звикання.

ТИГОФАСТ

антигістамінний препарат 3-го покоління для лікування алергічного риніту

- ✓ Початок дії – через 1 годину
- ✓ Тривалість протиалергічної дії – 24 години
- ✓ Застосування 1 раз на добу
- ✓ Для дорослих та дітей старше 12-ти років
- ✓ Не викликає сонливості



ВАШ ЗАХИСНИК ВІД АЛЕРГІЇ – ТИГОФАСТ!